

# Leçon d'arithmétique en terminale C : PGCD et PPCM

MOUNDOYI-MBOUNGOU Harold Amen  
Université Marien Ngouabi  
Ecole Normale Supérieure  
Congo

14 Août 2014



*Projet Prenum-AC*

## Présentation de la ressource

### *Dénomination de la ressource et des contributeurs*

Titre de la ressource : *PGCD et PPCM*

Nom de l'étudiant : *MOUNDOYI-MBOUNGOU Harold Amen*

Noms de l'encadreur : *Pas d'encadreur*

### Objectif pédagogique général

Utiliser les PGCD et PPCM pour résoudre les problèmes

### Objectifs pédagogiques spécifiques (O.P.S)

A la fin de la ressource, l'élève devra être capable de :

- Déterminer le *PGCD* et *PPCM* de deux entiers relatifs ;
- Utiliser les propriétés du *PGCD* et du *PPCM* pour démontrer ;
- Utiliser le théorème de Gauss et de Bézout pour démontrer et résoudre les problèmes ;
- Résoudre les équations diophantiennes de type :  $ax + by = c$

### Liens avec d'autres parties du programme Congolais

Les parties du programme ayant un lien avec cette ressource sont :

- La divisibilité dans  $\mathbb{Z}$  ;
- les congruences ;
- les nombres premiers.

## 1. Plus grand commun diviseur (PGCD)

**Exemple 1.** Pour simplifier la fraction  $\frac{159390}{49005}$  on peut diviser successivement le numérateur et le dénominateur par 5, puis 9, puis par 11.

$$\frac{159390}{49005} = \frac{31878}{9801} = \frac{3542}{1089} = \frac{322}{99}$$

La fraction  $\frac{322}{99}$  alors obtenue ne peut plus être simplifiée.

Pour passer de  $\frac{159390}{49005}$  à  $\frac{322}{99}$  on a simplifié par  $5 \times 9 \times 11 = 495$ .

495 correspond au plus grand diviseur qui soit commun aux deux nombres 159390 et 49005.

### 1.1 Propriété-Définition.

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls.

Un entier naturel qui divise  $a$  et qui divise  $b$  est appelé diviseur commun à  $a$  et  $b$ .

L'ensemble des diviseurs communs à  $a$  et à  $b$  possède un plus grand élément que l'on appelle le plus grand commun diviseur de  $a$  et de  $b$ , on le note  $PGCD(a, b)$ .

#### Exemple 2.

L'ensemble des diviseurs de 15 est  $\{1; 3; 5; 15\}$ .

Dans  $\mathbb{N}$  L'ensemble des diviseurs de 12 est  $\{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$ .

L'ensemble des diviseurs communs à 12 et 15 est donc  $D(12; 15) = \{1; 3\}$ .

On a donc  $PGCD(15; 12) = 3$ .

En écrivant l'ensemble des diviseurs de 159390 et l'ensemble des diviseurs de 49005, on peut obtenir  $PGCD(159390; 49005) = 495$  (exemple 1).

**Remarque.**  $a$  étant un entier naturel, l'ensemble des diviseurs de  $a$  est égal à l'ensemble des diviseurs de  $-a$ . 

On pourra étendre, si besoin la notion de  $PGCD$  à des nombres entiers relatifs.

On dira par exemple que  $PGCD(-15; 12) = PGCD(15; 12) = 3$ .

### 1.2 Propriété.

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls.

On a

$$PGCD(a; b) \leq a; \quad PGCD(a; b) \leq b; \quad PGCD(a; b) = PGCD(b; a)$$

Si  $b$  divise  $a$ , on a  $PGCD(a; b) = b$ , en particulier  $PGCD(a; 1) = 1$  et  $PGCD(a; a) = a$ .

#### Exemple 3.

6 est un diviseur de 18 donc  $PGCD(6; 18) = 6$ .

**Exercice 1.** (voir correction)

En écrivant les diviseurs de 18 et 48, trouve  $PGCD(18; 48)$ .

**Exercice 2.**(voir corr) déterminer :

a)  $PGCD(125468; 3)$    b)  $PGCD(8625; 5)$    c)  $PGCD(7253; 6)$

### 1.3 Propriété.

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls.

Soient  $q$  et  $r$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ . (On a  $a = b \times q + r$ )

Alors

si  $r = 0$     $PGCD(a; b) = b$

si  $r \neq 0$     $PGCD(a; b) = PGCD(b; r)$ .

**Exemple 4.** Pour trouver le  $PGCD$  de 2414 et 804, on peut écrire la division euclidienne de 2414 par 804.

$$2414 = 804 \times 3 + 2.$$

On en déduit alors  $PGCD(2414; 804) = PGCD(804; 2)$ .

Il est immédiat que  $PGCD(804; 2) = 2$  car 2 divise 804.

Donc  $PGCD(2414; 804) = 2$ .

**Exercice 3.** (voir corr) Déterminer :

a)  $PGCD(584; 64)$    b)  $PGCD(213; 5539)$    c)  $PGCD(35691; 221)$ .

**Exercice 4.**(voir corr) Démontrer que le  $PGCD$  de deux nombres entiers naturels non nuls consécutifs est égal à 1.

### 1.4 Propriété-Algorithmme d'Euclide.

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls.

On définit la suite  $r_n$  d'entiers naturels de façon suivante :

$r_0 = b$ ;    $r_1$  est le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ .

pour  $n \geq 1$

si  $r_n = 0$    alors  $r_{n+1} = 0$ .

si  $r_n \neq 0$    alors  $r_{n+1}$  est le reste de la division euclidienne de  $r_{n-1}$  par  $r_n$ .

Alors il existe un entier  $n_0$  tel que  $r_{n_0} \neq 0$  et pour tout  $n > n_0$ ,  $r_n = 0$  on a  $PGCD(a; b) = r_{n_0}$ .

**Remarque.** En effectuant ainsi des divisions euclidiennes successives de  $a$  par  $b$  puis du diviseur par le reste,... le premier reste non nul est le  $PGCD$  de  $a$  et de  $b$ . C'est l'algorithme d'Euclide.

Suivant les nombres  $a$  et  $b$ , le nombre d'itérations à effectuer peut être plus ou moins grand.

Sachant que  $PGCD(a; b) = PGCD(b; a)$  on aura toujours intérêt à prendre  $b \leq a$ .

**Exemple 5.**

a) pour déterminer le  $PGCD$  de 410258 et de 126 écrivant les divisions euclidiennes successives de 410258 et 126.

$$410258 = 126 \times 3256 + 2$$

$$126 = 2 \times 63 + 0$$

$$\text{Donc } PGCD(410258; 126) = 2$$

b) Calculons le  $PGCD$  de 1636 et de 1128 avec l'algorithme d'Euclide.

Etape	a	b	Reste	Quotient
1	1636	1128	508	1
2	1128	508	112	2
3	508	112	60	4
4	112	60	52	1
5	60	52	8	1
6	52	8	4	6
7	8	4	0	2

**Exercice 5.** En utilisant l'algorithme d'Euclide déterminer le *PGCD* de :

a) 853 et 212 b) 712 et 114 c) 650 et 8563 d) 12590 et 365

**Exercice 6.** Soit  $n$  un entier naturel. Déterminer suivant les valeurs de  $n$  le *PGCD* de  $n + 1$  et de  $3n + 4$ .

**Exercice 7.** Soit  $n$  un entier naturel. Déterminer suivant les valeurs de  $n$  le *PGCD* de  $n^2 + 5n + 7$  et de  $n + 1$ .

### 1.4 Propriété.

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturel non nuls.

- l'ensemble des diviseurs communs à  $a$  et à  $b$  est l'ensemble des diviseurs de leur *PGCD*.
- Pour tout entier naturel non nul  $k$ , on a  $PGCD(ka; kb) = k \times PGCD(a; b)$

**Exercice 8.** Déterminer l'ensemble des diviseurs communs à 656 et 312.

**Exercice 9.** Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls tels que  $b < a$ .  
Démontrer que  $PGCD(a; b) = PGCD(a - b; b)$ .

En utilisant cette propriété, faire apparaître un algorithme de recherche du *PGCD* des deux nombres 3587 et 2743.

## 2. Nombres premiers entres eux

### 2.1 Définition.

Dire que deux nombres entiers relatifs non nuls  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux signifie que  $PGCD(a; b) = 1$ .

### 2.2 Propriété.

$a$  et  $b$  désigne des nombres entiers relatifs non nuls.

Si  $d = PGCD(a; b)$ , alors il existe des nombres entiers relatifs  $a'$  et  $b'$  premiers entre eux tels que :

$$a = da' \quad b = db'$$

**Remarque.**



par hypothèse,  $d = PGCD(a; b)$ , donc  $d$  divise  $a$  et il existe un nombre entier relatif  $a'$  tel que  $a = da'$ . De même, il existe un nombre entier relatif  $b'$  tel que  $b = db'$ .

Donc

$$d = PGCD(a; b) = PGCD(da'; db') = |d|PGCD(a'; b')$$

or  $d \geq 1$ , donc  $|d| = d$  et  $d \neq 0$ , d'où  $PGCD(a'; b') = 1$

### Exercice.

$a = 3n + 4$  et  $b = 2n + 3$  où  $n$  désigne un nombre entier naturel.  
Démontrer que  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux.



**Solution.** Pour démontrer que  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, il suffit de déterminer une combinaison linéaire de  $a$  et  $b$  égale à 1.

Pour cela ;

$$3b - 2a = 3(2n + 3) - 2(3n + 4) = 1$$

on note  $d = PGCD(a; b)$ .

$d$  divise  $a$  et  $b$ , donc divise  $3b - 2a$  c'est-à-dire 1. Or le seul diviseur de 1 est lui-même. Donc  $d = 1$ .  
Ainsi pour tout  $n$ ,  $PGCD(a; b) = 1$ .

## 3. Plus petit commun multiple (PPCM)

**Exemple 1.** pour effectuer le calcul  $\frac{65}{18372} - \frac{21}{15310}$ , on peut réduire les fractions au même dénominateur.

$$\frac{65 \times 15310}{18372 \times 15310} - \frac{21 \times 18372}{15310 \times 18372} = \frac{995150}{281275320} - \frac{385812}{281275320} = \frac{609338}{281275320}$$

on simplifie ensuite  $\frac{609338}{281275320}$  en cherchant le  $PGCD$  de 609338 et de 281275320 et on obtient  $\frac{199}{91860}$ .

Si on avait pu prévoir que 91860 était un multiple commun à 18372 et à 15310 (et même que c'était le plus petit multiple commun), les calculs en auraient été simplifiés.

En effet 91860 étant égal à  $18372 \times 5$  et à  $15310 \times 6$ , on aurait pu écrire

$$\frac{65 \times 5}{18372 \times 5} - \frac{21 \times 6}{15310 \times 6} = \frac{325}{91860} - \frac{126}{91860} = \frac{199}{91860}$$

La recherche des multiples communs à deux nombres présente donc un intérêt certain pour le calcul.

### 3.1 propriété-Définition.

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls.

l'ensemble des multiples strictement positifs communs à  $a$  et  $b$  possède un plus petit élément.

Ce plus petit élément est appelé "**plus petit commun multiple**" de  $a$  et  $b$ .

On le note  $PPCM(a; b)$ .

**Remarque.** On a de façon immédiate :

$$PPCM(a; b) = PPCM(b; a)$$

si  $b$  est multiple de  $a$ ,  $PPCM(a; b) = b$ .

**Exercice 1.** Ecris l'ensemble des multiples strictement positifs de 

Ecrit l'ensemble des multiples strictement positifs de 6.

Ecrit l'ensemble des multiples strictement positifs communs à 6 et à 10.

Quel est le  $PPCM$  de 6 et 10.

**Exercice 2.** Ecris l'ensemble des multiples de  $a$  et l'ensemble des multiples de  $b$ , et en déduire

$PPCM(a; b)$  dans chacun des cas suivant :

1)  $a = 15; b = 24$  ; 2)  $a = 8; b = 12$  ; 3)  $a = 9; b = 16$

**3.2 Propriété.** Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls.

- $PGCD(a; b)$  divise  $PPCM(a; b)$
- $PGCD(a; b) \times PPCM(a; b) = a \times b$
- Si  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, on a  $PPCM(a; b) = a \times b$
- Si  $k$  est un entier naturel non nul, on a  $PPCM(ka; kb) = k \times PPCM(a; b)$

**Exercice 3.** pour chacun des couples  $(a; b)$ , déterminer  $PGCD(a; b)$  et en déduire  $PPCM(a; b)$

1)  $a = 42$  ;  $b = 184$  2)  $a = 56$  ;  $b = 1716$  3)  $a = 115$  ;  $b = 244$

**Exercice 4.**  $n$  est un entier naturel non nul, déterminer

1)  $PPCM(12n; 15n)$  2)  $PPCM(2n; 2n + 1)$  3)  $PPCM(5n + 7; 2n + 3)$

**3.3 Propriété.** Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls.

L'ensemble des multiples communs à  $a$  et à  $b$  est l'ensemble des multiples de leur  $PPCM$ .

**Exercice.** Soient  $a, b$ , et  $c$  trois entiers naturels non nuls.

Démontrer que si  $c$  est divisible par  $a$  et par  $b$ , alors  $c$  est divisible par  $PPCM(a; b)$ .

## 4. Théorème de Bézout

### 4.1. Identité de Bézout

$a$  et  $b$  désignent deux nombres entiers relatifs non nuls.



Si  $d = PGCD(a; b)$ , alors il existe des nombres entiers relatifs  $u$  et  $v$  tels que  $au + bv = d$ .

**Exemple.** On sait que  $PGCD(55; 35) = 5$ , donc d'après l'identité de Bézout, il existe des nombres entiers relatifs  $u$  et  $v$  tels que  $55u + 35v = 5$  par exemple  $u = 2$  et  $v = -3$ .

En effet,  $55 \times 2 + 35 \times (-3) = 5$ .

**Remarque.**

- Le couple  $(u; v)$  n'est pas unique! si  $a = 3$  et  $b = 2$ ,  $PGCD(a; b) = 1$  et  $1 \times 3 - 1 \times 2 = 1$ , mais aussi  $-1 \times 3 + 2 \times 2 = 1$ .
- La réciproque de l'identité de Bézout est fautive. par exemple,  $3 \times 2 - 2 \times 2 = 2$  et pourtant 2 n'est pas le  $PGCD$  de 2 et 3.

### 4.2. Théorème de Bézout

$a$  et  $b$  désignent deux nombres entiers non nuls.

$a$  et  $b$  sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe des nombres entiers relatifs  $u$  et  $v$  tels que  $au + bv = 1$ .

**Démonstration.**

- Si  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, alors  $PGCD(a; b) = 1$ .  
L'identité de Bézout permet alors de dire qu'il existe des nombres entiers relatifs  $u$  et  $v$  tels que  $au + bv = 1$ .
- Réciproquement, s'il existe des nombres entiers relatifs  $u$  et  $v$  tels que  $au + bv = 1$ , tout diviseur communs à  $a$  et à  $b$  divise  $au + bv$ , donc 1.  
Donc  $PGCD(a; b) = 1$  et donc  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux. □

**Exemple.** Pour tout nombre entier naturel  $n$  non nul,  $3 \times (5n + 7) - 5 \times (3n + 4) = 1$ , donc d'après le théorème de Bézout,  $5n + 7$  et  $3n + 4$  sont premiers entre eux.

**Exercice.**  $n$  désigne un nombre entier naturel non nul.  
Démontrer que  $a = 2n + 1$  et  $b = 3n + 2$  sont premiers entre eux.

**Solution.** L'idée consiste à faire une combinaison linéaire de  $a$  et  $b$  indépendante de  $n$ , c'est-à-dire dans laquelle les  $n$  sont "éliminés".

$$-3a + 2b = -3(2n + 1) + 2(3n + 2) = -6n - 3 + 6n + 4 = 1$$

$$-3a + 2b = 1$$

Il existe donc des nombres entiers relatifs  $u = -3$  et  $v = 2$  tels que  $au + bv = 1$ .  
Donc, d'après le théorème de Bézout,  $2n + 1$  et  $3n + 2$  sont premiers entre eux.

**Exercice.** On considère  $a = 145$  et  $b = 55$ .

- Déterminer  $PGCD(a; b)$  avec l'algorithme d'Euclide.
- En exprimant de proche en proche chaque reste en fonction de  $a$  et  $b$ , déterminer un couple  $(u; v)$  de nombres entiers relatifs tels que  $au + bv = PGCD(a; b)$

**Solution.** a)

	a	b	Reste
Etape 1 : $145 = 55 \times 2 + 35$ →	145	55	35
Etape 2 : $55 = 35 \times 1 + 20$ →	55	35	20
Etape 3 : $35 = 20 \times 1 + 15$ →	35	20	15
Etape 4 : $20 = 15 \times 1 + 5$ →	20	15	5
Etape 5 : $15 = 5 \times 3$ →	15	5	0

Donc  $PGCD(a; b) = 5$

b) On remonte l'algorithme d'Euclide à partir de l'étape 4 en isolant les restes dans un membre.

$$\begin{aligned}
 5 &= 20 - 15 \times 1 \\
 &= 20 - (35 - 20 \times 1) \times 1 \\
 &= -35 + 20 \times 2 \\
 &= -35 + (55 - 35 \times 1) \times 2 \\
 &= 55 \times 2 - 35 \times 3 \\
 &= 55 \times 2 - (145 - 55 \times 2) \times 3 \\
 5 &= 55 \times 8 - 145 \times 3
 \end{aligned}$$

Donc  $5 = 145 \times (-3) + 55 \times 8$ , on en déduit que  $5 = au + bv$  avec  $u = -3$  et  $v = 8$ .

## 5. Le théorème de Gauss

$a$ ,  $b$  et  $c$  désignent trois.

nombres entiers relatifs non nuls.

Si  $a$  divise le produit  $bc$  et si  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, alors  $a$  divise  $c$ .

**Démonstration.**  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe des nombres entiers relatifs  $u$  et  $v$  tels que  $au + bv = 1$ .

En multipliant chaque membre de l'égalité par  $c$ , on obtient  $auc + bvc = c$ .

$a$  divise  $auc$  et par hypothèse,  $a$  divise  $bc$  donc  $bvc$ , donc  $a$  divise  $auc + bvc$ , c'est-à-dire  $a$  divise  $c$ .  $\square$

**Remarque.** Il est essentiel de vérifier que  $a$  est premier avec  $b$ , car  $a$  peut diviser  $bc$  en ne divisant ni  $b$  ni  $c$ . Par exemple,  $300 = 15 \times 20$ , or 6 divise 300 sans diviser ni 15, ni 20.

**Exemple 1.** Résoudre l'équation  $7x = 11y$  avec  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

- Si  $7x = 11y$ , alors 11 divise  $7x$ . Or 7 et 11 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, 11 divise  $x$ . Par conséquent, il existe un nombre entier relatif  $k$  tel que  $x = 11k$ . Alors de  $7x = 11y$ , on déduit que  $7 \times 11k = 11y$ , soit  $y = 7k$ .
- Réciproquement, tous les couples  $(11k; 7k)$  sont solutions de l'équation  $7x = 11y$ .  
En effet,  $7 \times 11k = 11 \times 7k$ .
- Conclusion.  
Les solutions de l'équation  $7x = 11y$  sont les couples  $(11k; 7k)$  avec  $k \in \mathbb{Z}$

## Conséquence

**Propriété.**  $a$ ,  $b$  et  $c$  désignent des nombres entiers relatifs non nuls.

Si  $b$  et  $c$  sont premiers entre eux et divisent  $a$ , alors  $bc$  divise  $a$ .

**Démonstration.**

- $b$  divise  $a$  donc il existe un nombre entier relatif  $k$  tel que  $a = kb$ .
- $c$  divise  $a$  donc il existe un nombre entier relatif  $k'$  tel que  $a = k'c$ .

Ainsi  $kb = k'c$ .

On en déduit alors que  $b$  divise  $k'c$ .

$b$  et  $c$  étant premiers entre eux, on déduit d'après le théorème de Gauss, que  $b$  divise  $k'$  c'est-à-dire qu'il existe un nombre entier relatif  $k''$  tel que  $k' = k''b$ .

De  $a = k'c$ , on déduit alors  $a = k''bc$  donc  $bc$  divise  $a$ .

**Exemple 2.** le nombre 1573875 est divisible par 5 (car le chiffre des unités est 5) et il est divisible par 9 (car la somme de ses chiffres est divisible par 9). Or 9 et 5 sont premiers entre eux, donc 1573875 est divisible par  $5 \times 9$ , soit 45.

**Exemple 3.** Le produit  $n(n+1)(n+2)$  de trois nombres entiers naturels consécutifs est divisible par 2 et par 3. Ce produit est donc divisible par 6 puisque 2 et 3 sont premiers entre eux.

## 6. Résoudre une équation diophantienne

**Activité.**

(E) est l'équation  $7x - 11y = 3$  où  $x$  et  $y$  sont des nombres entiers naturels.

- a) Vérifier que le couple  $(x_0; y_0) = (13; 8)$  est solution de l'équation  $(E)$ .  
b) En déduire la résolution de l'équation  $(E)$ .

**Solution.**

a)  $7x_0 - 11y_0 = 7 \times 13 - 11 \times 8 = 3$ , donc  $(x_0; y_0)$  est une solution de  $(E)$ . 

b) un couple  $(x; y)$  est solution de  $(E)$  si, et seulement si,  $7x - 11y = 3$ , ce qui équivaut à :  $7x - 11y - (7x_0 - 11y_0) = 3 - 3$  (on retranche 3 à chaque membre de  $(E)$ ), c'est-à-dire  $7(x - x_0) = 11(y - y_0)$ . Or d'après l'exemple 1 ci-dessus, les solutions de cette équation sont les couples  $(x - x_0; y - y_0) = (11k; 7k)$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

Ainsi les solutions de l'équation  $(E)$  sont les couples  $(x; y)$  tels que :

$$x = x_0 + 11k = 13 + 11k \quad \text{et} \quad y = y_0 + 7k = 8 + 7k \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{Z}$$